

DIVINA ADSPIRANTE GRATIA,  
INCLYTA FACULTATE MEDICA JENENSI  
GRATIOSE INDVLGENTE,

MODERANTE  
VIRO EXCELLENTISSIMO,

DN. AUGUSTINO HENRICO  
FASCHIO, M. D. D.

ANAT. CHIRURG. & BOTAN. PROF. PUBL.  
ARCHIATRO DUCALI SAXONICO,  
FACULTATIS SUÆ p. t. DECANO  
SPECTATISSIMO,

DN. DOCTORE ATQVE PROMOTORE ÆTATEM  
PLURIMUM MIHI OBSERVANDO

# RESPIRATIONIS

## LÆSIONES HYPOCHON- DRIACO-SCORBUTICAS,

*PRO LICENTIA*

SUMMOS IN ARTE MEDICA HONORES ET PRI-  
VILEGIA DOCTORALIA CONSEQVENDI

*publica censura exponit*

### GEORGIUS FRIDERICUS CELLARIUS,

HASELLA-SCHWARTZBURGICUS,

*ad diem XVII. Novembr. M. DC. LXXVII.*

IN AUDITORIO MAJORI  
horis ante- & pomeridianis.



紅





# I. N. F.



Vod in Chymicorum foculis videmus, ab aëris admissi quantitate ignis dependere regimen, eundemque vel intendi aëre liberiore ventilatum, vel extingvi penitus, isto velut pabulo subtracto; Idem in nobis tota die observamus, ab inspirato aëre sustentari flammulam vitalem, ac extingvi protinus, spiritu ad breve temporis intervallum præcluso. Ita nimirum est, quamdiu respiramus, vivimus; quando expiramus, morimur. Cibo ad tempus satis longum quosdam abstinuisse legimus; auram aetheream semper vescimur, ac ne paucissimis quidem horae minutis absque inevitabili vel vitae, vel valetudinis discrimine possumus carere. Ut undis submersos ac patibuli candidatos jam non attingamus, nec apoplecticos, hystericas, anginosos, hydroxicos, pleuriticos, aliosque isto aëris comœatu intercluso, suffocatos pluribus commemoremus: Vel solos asthmaticos intueamur, quibus non angustiis ac ineffabili cordis anxietate, ob pabuli vitalis penuriam, miseri tenentur! *Omnia corporis aut incommoda, aut pericula per me transferunt, elegantissime Seneca scribit epist. LIV. nullum mihi suspirio videtur molestius; aliud enim, quicquid est, egrotare est: hoc, animam agere.*

Præ reliquis verò hypochondriaci ac scorbutici frequentissime, quantum aëris liberior inspiratio præpedita valetudinis sit dispendium, magno cum damno experiuntur. Videas enim plerosque horum aliquando continuo, sæpius à levissimo motu anhelos, & vitalem auram anxii captantes suspiriis: Alios desubito tanta præcordiorum angustia, ac velut suffocatoria anxietas invadit, ut, quò se vertant, nescii, perpetuam mortis formidine, quam ipsam



morte terribiliorem judico, teneantur. Nec novum, quosdam cum molestissimo malo aliquandiu conflictatos, ex improvise tandem, spiritu planè intercepto, suffocari.

Atque cum respirationis læsiones, ab hypochondriacâ & scorbuticâ labe inductæ, in praxi frequentissimè occurrant, ac à vulgò notis respirationis læsæ symptomatibus tum quoad causam, tum quoad medendi methodum immanè quantum differant, à nemine tamen, quod sciam, distinctè fatis, & quantum rei usus exigit, expositæ fuerint; placuit eas inclutæ Facultatis medicæ autoritate, in Dissertationis Inauguralis materiam seligere, earumque ætiologiam ac therapiam uberius paulò, quantum quidem pagellarum angustia & ingenii vires permittent, persequi; Faxit supremum Numen, ut omnia ex voto succedant!

## CAPUT I.

### *Generalia quædam tum de respiratione ejusque læsionibus, tum de malo hypochondriaco ac scorbutico præcognoscenda.*

#### §. I.

**U**T in eruendis læsionibus respirationis hypochondriaco-scorbuticis, earumque causis feliciter progrediamur, è re fore videtur, pauca tum de respiratione ejusque læsionibus, tum de hypochondriacâ atque scorbuticâ affectione in genere, quantum instituti ratio postulat, præmonere.

II. *Respirare* animalia dicuntur, quando aërem in pectus admittunt, eundemque vicissim emittunt. *Respiratio* itaque duobus absolvitur actibus alternatim reciprocantibus, *inspiratione*, quâ auctâ ob elevationem thoracis & diaphragmatis contractionem, pectoris cavitate, aër pulmonem vesiculas intrans eos expandit undique, & cavitati pectoris coextendit; & *expiratione*, quâ coarctatò rursus thorace, & fibris diaphragmatis relaxatis, pulmones comprimuntur, & sic aër admissus iterum expellitur.

III. Qui



III. Qui aëris reciprocus per pulmones motus ad vitam, ejusque munia continuanda adeo necessarius est, ut eò ne paucissimis quidem horæ minutis absque præsentissimo vitæ periculo abstinere verè queamus, quod fit, quatenus *respiratione circularis sanguinis per pulmones, atque adeo universum corpus, motus promovetur*, quò inhibitiõ sanguis circa præcordia concrefcere incipit, cor à motu, & animal à muniis vitalibus brevi cessat. Ut nihil de sanguinis refrigerio *Veterum*, condensatione *Sylvianâ*, miscelâ in pulmonibus *Malpighiana*, aliisque ulibus minus principalibus nunc addamus.

IV. Ad istam verò continuam aëris reciprocationem, præsuppositò animæ & spirituum animalium influxu, concurrunt 1. activè quidem *musculi omnes, costas modò elevantes*, atque sursum-extrorsum moventes pro inspiratione; quales ferrati postici superiores & inferiores, levatores costarum *Stenonis*, & cervicales descendentes *Dümmerbroccii*: *modò rursus deprimere*, ac deorsum-introrsum movere *valentes*, pro expiratione, in moderatâ quidem, solùm musculi sacrolumbi; in auctâ simul musculi abdominis recti & obliqui. 2. *Diaphragma*, fibrarum contractione, hancque subsequente centri membranacei concavitate ad pectoris cavitatem augendam; rursus verò fibrarum relaxatione, & consequente centri membranacei globositate ad thoracis coarctationem aliquantum contribuens. 3. Passivè magis *pulmones*, ex innumerabili vesicularum orbicularium congerie contexti; quas arteriæ & venæ pulmonalis exilissimæ propagines undique cingunt atque colligant, quæque facillimè ab aëre intrante expandi eodemq; rursus emissõ subsidere queunt. 4. Præter jam dicta *os, fauces, nares, larynx, aspera arteria*, liberum aëri meatum concedendo: *nervi cervicis, dorsi ac lumborum, costæ omnes, sternum, clavicula, scapula* &c. motui thoracis velificando; *aër ipse atque sanguis* intra pulmones recipiendus, insigne conferunt momentum.

V. Cumq; tanto instrumentorum apparatu ad functionem hanc nobilissimam opus habeat natura, non mirum, eam diversimodè lædi, modò viis prædictis liberum aëri ingressum negantibus, modò pulmonibus ob bronchiorum infarctum aërem debitâ quantitate non admittentibus, modò diaphragmate & musculis



lis respiracioni dicatis, expansionem pulmonum pro hauriendo aëre necessariam vel impredientibus, vel certè non debitè promoventibus: ut nihil de sangvinis aërisque indispositione nunc addamus; Unde infinitæ propemodùm exurgunt respiracionis læsiones, quas erudito opere persequitur *Fabr. Bartoletus, Bononiensis*, cui Tit. *Methodus in dispnæam*. Nobis in præfenti istas solùm respiracionis læsiones seligere placuit, quas depravatio sangvinis hypochondriaco-scorbutica inducit. Eas verò antequam aggrediamur, paucissima adhuc de affectione hypochondriaca atque scorbutica erunt præmittenda.

VI. Coniungere utramque placuit, quoniam, effato *Willisti de scorbut. cap. 2* affectioni hypochondriacæ scorbutus adeò affinis est, ut illi sæpissimè aut comitem se adjungat, aut superveniat; quâ de causâ quibusdam affectus hypochondriacus consummatus audit. Concipio nimirum in utroque affectu cum *Gregorio Horstio Tract. de scorbuto, sanguinem crudum & ichorosum*, hoc est, ut ex *Neotericorum* principiis terminos istos illustremus, sanguinem nunc limosum, feculentum, ♀eum, vappescentem; nunc sero acri, salibus modò lixivis, modò acidis, austeris, Onosis, ♂latis inquinato, plus minus dilutum. *Crudum* quidem sanguinem dejectus corporis vigor, lassitudo spontanea, torpor & membrorum gravitas, aliaque hujus generis symptomata; *Acrimoniam salinam* dolores intolerabiles & partium nervosarum lancinationes multivarie plus satis produnt; quibus si gingivas corrosas, ulcera crurum depascentia, linteamina & vasa tum vitrea, tum ænea ab □â, sanguine per hæmorrhagiam emisso & vomitu scorbuticorum brevi tempore corrosa, addideris, de salibus scorbuticorum corrosivis nullum amplius erit dubium, Exemplata talia annotarunt *Döringius l. 1. de Medicin. & Medico, Salmuth. l. 2. observ. 4. Dn. D. Ettmüller. de Medicina Hippocr. chymicâ*, aliique.

VII. Generatur verò crudus ejusmodi & ichorosus sanguis potissimum viscerum chylicationi & sangvificationi inservientium vitiò, nunc unius, nunc plurium. Cumque qualis chylus, talis sanguis; qualis sanguis, talis plerumque soleat esse sanitas, meritò ad primam œconomie animalis culinam, *Ventriculum*, ante omnia respiciendum, quando vel ob fibrarum relaxationem  
nimiam,



nimiam, vel fermenti vitiò, vel caloris atque spirituum affluen-  
tium defectu, vel ingestorum culpâ chylus non debite aërescit,  
nec particulae dulces, balsamicae, substantificae ritè evolvuntur,  
sed longiori, quàm par est, in ventriculo morâ in massam vappe-  
scentem, viscidam, acrem, acidamve liquantur, partibus chyli te-  
nuioribus & spirituosioribus interim justo citius elapsis, sangvi-  
nem ferosiores, inque ebullitiones pronum producentibus.

IIX. Massa prædicta acida, viscida &c. in flatus quippe re-  
solvi aptissima, partim ventriculum inflat atque distendit, unde  
inflationes dolorificae & tormina varia; partim plicis ventriculi  
inhærens ingesta quævis corrumpit, atque simili acore inquinat,  
quæ postmodum sub chylosi liquaminis larvâ ventriculo elapsa,  
modò ob viscositatem & limositatem in venis lacteis stagnando,  
modò ob acorem sangvinem in mesaraicis coagulando, atque ad  
obstructiones disponendo, modò massæ sangvineæ infusa eandem  
diversimodè vitiando, ad hypochondriacam & scorbuticam cor-  
ruptionem apprimè disponunt.

IX. Nec verò solus ventriculus, aut chyloseos defectus u-  
nicè accusandus, cum non rarum sit, chylo sic satis licet laudabi-  
li, & nullo in primis viis apparente vitio, sangvinem nihilominus  
hypochondriaco-scorbuticam depravationem suscipere; quando  
nimirum viscera sangvinis depuratoria vel ob propriam, quacunq;  
de causa contractam ἀσθία, vel ob massæ sangvineæ δυσπρασίαν, cru-  
oris recrementa, *hepar* quidem biliosa, lixiva, ἄρεο-θηνα, *lien* ve-  
rò, *pancreas aliæve glandulae* serosa, acore occulto & φεις feculen-  
tiis inquinata &c. non debite vel secernunt, vel ad secernendum  
disponunt.

X. Unde sangvis pro feri saliumq; diversorum constitutio-  
ne, mixtione & proportione variâ nunc biliosus nimis, lixivus atq;  
fluxilis, in resolutiones, ebullitiones atque excandescencias pro-  
nus; nunc acidus, austerus, acerbus, ad stagnationem & grume-  
scentiam dispositus, tot, tamq; diversa, & non rarò contrariis pla-  
nè frontibus pugnantiâ symptomata pro naturæ directione, tem-  
peramentorum diversitate & dispositione partium producit, quo-  
rum intuitu affectionem hypochondriacam & scorbuticam aliam  
calidam, aliam frigidam non ineptè quis dixerit: Quemadmodum



*Willisius* quoque duplicem sanguinis dyscrasiam in affectu hypochondriaco & scorbuto agnoscit, unam adustam, præfervidam, Aëo-Θinam, quam cum vino rancido in scorbuto comparat; alteram frigidam, Θno-Æream, vino pendulo æquiparandam, *libr. de morbis convulsiv. cap. 11. & de scorbuto cap. 1.*

XI. Ex causis remotioribus 1. malam victus rationem, 2. affectuum exorbitantiam, 3. aëris vitium & contagium, ac demum febres diuturnas prægressas nominasse sufficiat; quibus in antecessum delibatis sequitur nunc in

## CAPITE II

### *Historia læsionum respirationis hypochondriaco-scorbuticarum.*

I. **R**espirationem in hypochondriacis atque scorbuticis diversimodè lædi, tum constans Medicorum observatio, tum quotidiana experientia abundè testatur. Quanquam enim, ut benè in Praxi *Sennertus* observat, à minus attentis, præcipuè sub morbi initium, non protinus spirandi difficultas animadvertatur, ea tamen, accedente potissimum validiore corporis motu, tantum abest, ut latere possit, quin potius cum notoriâ pectoris angustia, cordisq; anxietate subindè manifesto nimis sese prodatur. Quare inter potiora affectionis hypochondriacæ & scorbuticæ tum signa, tum symptomata istam anhelitus difficultatè cum pectoris angustia numerant *Eugalenus, Ronsæus, Forestus, Sennertus, Horstius, Highmorus, Willisius*, & quicumque de affectuum prædictorum alterutro quidquam consignerunt. Quin *Forestus* non veretur pathognomonicis scorbutici signis reliquis, crurum cum dolore debilitati, gingivarum pruriginosæ rubedini ac dolori, coloris faciei in nigredinè vergenti, præcordiorum quoque angustiam accensere, *lib. XX. obs. 11.*

II. Uti verò communiter respirationis læsæ diversa numerantur genera, gradus & differentia, præcipuè quatenus nunc abolita, nunc imminuta, aucta vel depravata occurrit; Ita in hypochondriaco-scorbuticâ quoque passione non unius generis spirandi



randi difficultas, nec ex iisdem causis tùm continentib9, tùm pro-  
catarticis inducta observatur, sed modò mitius, modò gravius;  
aliquando continuò, sæpiùs periodicè, nec rarò cum syncopes vel  
suffocationis discrimine, aliisque symptomatibus infestare solet.  
Variantq; in infinitum penè, quæ circa respirationē in hypochon-  
driacis & scorbuticis contingunt, phænomena.

III. Plerique, potissimùm quibus crudus, depauperatus, ad  
æquabilem circuitum & rarefactionem ineptus sanguis existit,  
continuò crebriorem densioremq; solito ducunt spiritum, quem  
tamen, ob habituatam velut consuetudinem, minus molestum ex-  
periuntur, nisi vehementius paulò corpus commoverint. Aliis  
ad levissimum corporis motum anhelitus difficultas ingravescit,  
potissimùm, quando vel scilas, vel alium locum acclivem ascen-  
dere conantur. Cujus phænomeni ratio tùm ex *Willisio cap. 3. de*  
*scorbuto*, tùm inferiùs ex *cap. 3. §. 6.* petenda.

IV. Plures, à spirandi quacunq; difficultate cetera immu-  
nes, per intervalla nunc breviora, nunc longiora paroxysmis asth-  
maticis corripuntur, ut altius, crebrius, densiusq; ac laboriosius  
haurire spiritum cogantur, cum insigni non rarò angustiâ præcor-  
diorum, tensione hypochondriorum & suffocatoriâ anxietate,  
sic flagen / es sey ihnen so angst und bange / so enge / voll und ge-  
spannet um die Brust / daß sie nicht zu bleiben wüsten. Idque  
modò absque causâ manifestâ, modò à causis occasionalibus va-  
riis.

V. Ita observare licet, quosdam horâ unâ vel alterâ à pastu  
insignem experiri anhelitûs molestiam, cum vel sine phlogosi &  
incalescentiâ extremorum, idque modò à chylo vitioso cordi ad-  
vecto, modò ab inflatione & tensione hypochondriorum. Simi-  
liter ab exercitio vehementiore corporis, animi excandescencia,  
vel aliis passionibus gravioribus, assumtis calidioribus, acribus &  
flatulentis frequentissimè spirandi ingruit difficultas, quemadmo-  
dum in nobili juvene, calidâ & siccâ viscerum constitutione prædi-  
to, palpitationem cordis cum respiratione difficili & quasi suffo-  
cante, ab exercitio vehementiore, viniq; potu largiore sæpiùs  
ingruentem adnotavit *Greg. Horstius lib. III. obs. med. 13.* Ac in stu-  
dioso nobili hypochondriaco, post vini generosioris ingurgitatio-  
nem, dulciumque immoderatum usum ira vehementiori, dissidii



oborti occasione, excandescente, subitam eamque gravissimam, spirandi difficultatem, cum suffocatoria anxietate & motibus convulsivis observavit *Experientisf. Dn. D. Præses*, Præceptor atque Promotor jugiter devenerandus. A purgantibus quoque validioribus dyspnœam scorbuticam in dispositis productam Autorum testantur observationes.

VI. Porrò notari quoque meretur, scorbuticos quosdã decumbentes liberè satis spirare, dũ verò se movent aut erigunt, ac erecti aliquandiu sedere conantur, ob anhelitus insignem difficultatem & angustiam, animi deliquio tentari, quod tùm in aliis pluribus, tùm potissimum in Prætorè Castricomio observavit *Forestus*, qui, quoties levissimo sese motu erigeret, in syncopen cadebat, ita ut sæpè pro semimortuo reputaretur, *lib. XX. obs. 12.* & in Viro quodam Magnifico *Möllenbroccius de Artbrid. vag. scorb. cap. 3.* qui statim, ac è lecto surgebat, animo linquebatur. E contrariò alii de die, & ubi erecti incedunt, liberà satis respiratione gaudent; noctu verò, inclinatò ad somnum corpore, laboriosissimum protinus anhelitum ducunt, quod in stannario observavit *Dn. D. Ettmüller Lipsiensis*, & in scorbuticis serosioribus non infrequenter contingere, planè mihi persuadeo, ob rationem inferiùs *cap. 4. §. 5.* exponendam.

VII. Non incongruum hòc locò erit, asthma nocturnum *Sincubum*, quem nostro idiomate den *Usp/die Drutte* nominant, commemorare, symptoma hypochondriacis & scorbuticis plerisque, admodùm familiare, ad quod tanquam Dæmonis ludibrium, credulum inque superstitionem pronum vulgus expavescit. Estque nihil aliud, quàm respirationis & vocis interceptio, cum strangulationis metu, & oneris pectori incumbentis insomnio. Accidit ferè dormientibus tantum, supino tùm totius corporis, tùm potissimum capitis decubitu. Inter rarius contingentiã numerandum, quod observavit *Rolfincius*, interdium & vigilantem incubo correptum fuisse, cui simile quid contubernali cuidam meo accidisse memini, qui dormituriens, & oculis vix ad somnum compositis, molestum hoc onus experiebatur.

IX. Frequentissimè in praxi occurrit, à *μῆλας ἀοει* materiæ peccantis *¶* ex, scorbuticæ ad pectus & spiritalia organa, asthma, gravissimum, aliquando suffocatorium, nec rarò funestum induci. Sic totà die occurrit, ab arthritide scorbuticâ vel incautâ frigoris admissio-



admissione, vel topicorum præposterâ applicatione, retropulsa, vel aliâ quacunque de causâ retrogradâ, anxietatem præcordiorum cum laboriosissimô anhelitu invadere, quod vulgus effert: *Das Zipperlein ist ihm in den Leib getreten / und machet Herzens-Angst.* Polemarcho de Thermes, cum irarum æstu conflagraret, suppressa est materia arthritica, inde natum asthma, quod illum ad exitum præcipitavit, quod advertit *Duretus Schol. ad Holler. de morb. intern. lib. I. cap. 25.* Sic podagrâ repulsâ asthma excitatum notarunt *Crato conf. 367. Trincavell. lib. XII. c. 1.* uti contra quendam ab orthopncea liberatum superveniente podagra notavit *Dodonæus obs. cap. XX.*

IX. Pariter à scabie, per intempestivas inunctiones Gales, Gratas, Hninas &c. retropulsâ, ulceribus præmaturè clausis, tumoribus scorbuticis evanescentibus, idem symptoma observatur; quod Viro cuidam pl. reverendo, mihi que tam sanguinis vinculo, quàm singulari affectu conjunctissimo, à tumore pedis sinistri scorbuticô absque causâ manifestâ evanescente, funesto, & suis pariter ac bonis omnibus lamentabili eventu accidisse, ex communicatione benevolâ *Excellent. Dn. D. Mackii*, Archiatri Schyvartzburgici celebratissimi, habeo.

X. Denique nec illud prætereundum, quod tum alii, tum potissimum *Sennertus Pmx. lib. III. part. V. sect. 2. cap. 4.* & *Willisus de scorbuto cap. 3.* annotarunt, scorbuticos quosdam (addo & hypochondriacos) de angustia cordisque anxietate magis, quàm respirationis difficultate, & pulmonum motu inhibito conqueri, quæ angustia interdum adeò augeatur, ut lypothymiam minetur, & caligo oculis offundatur, ac nisi tollatur, ægri statim animam reddaturi videantur. Speciatim advertit *Willisus loc. cit.* sentire quosdam præcordia ambitumque thoracis arctius constringi, ac in minus spatium coarctari; quale quid in *Senatore Bononiensi* hypochondriaco *Claudinus conf. 110.* observavit, cui inter respirandum thorax velut vinculo quodam constringi, ut dilatari non posset, & cor quasi opprimi videbatur. Quod inspiratio expiratione laboriosior existat, ac non rarò media quasi via & thorace terminetur, vulgo notum, habetque id asthma scorbuticum cum vulgari ferè commune. At verò inspirationem aliquando nimis profun-



dè duci, ut laborantes ægre & difficulter expirent, quod laudatus *Willisius loc. cit.* advertit, à paucis hæcenus observatum invenio.

XI. Enumerata hæcenus, & quæ plura hùc collimantia recenserì possent, phænomena ut in unum tandem colligamus, in eo omnia conveniunt, quòd *ex hypochondriaco-scorbuticâ labè respiratio læsa* existat, quam receptæ methodo morem gesturi describimus, quòd sit *motus thoracis, diaphragmatis, & pulmonum, ob horum expansionem, variis de causis, deinceps nominandis, impeditam, à naturali deflectens.* Cumque superius monitum fuerit, ac ex antedictis facilè colligatur, spirandi difficultatem modò mitius, modò atrocius infestare, non multum peccabimus, si distinctionis melioris gratiâ spirandi difficultatem leviozem *dyspnæ hypochondriaco-scorbuticæ, graviozem asthmatis, nunc continui, nunc periodici, gravissimam cum suffocationis extantiori discrimine conjunctam, suffocationis nomine complectamur.*

XII. Ac quod speciatim suffocationem attinet, experientia crebrior confirmat, spirandi difficultatem in scorbuticis & hypochondriacis nonnunquam adeo ingravescere, ut vox etiam omnis intercipiatur, quod apud *Scholzium conf. 182.* observavit *Matthiolus*; & suffocationis periculum immineat præsentissimum, apud *Claudinum conf. 98. Willisium de morbis convulsivis, aliosque.* Quin non improbabile videtur, feminas quoque hypochondriacas & scorbuticas, ob labem similem aliquando paroxysmis suffocatoriis tentari, qui promiscuè vulgo pro hystericis, sed perperam venditantur.

## CAPUT III.

### *Causæ læsionum recensitarum.*

I. **U**T respiratio naturaliter fiat, duo potissimum sunt necessaria, quorum *primum* est, ut viæ aëri ingressuro & egressuro libere pateant; *alterum*, ut aër pulmones debite expandere & explicare queat; Quoties itaque vel viæ obstructæ, vel expansio pulmonum impedita, diversimodè læditur respiratio. Ubi usum auctum nullatenus excludimus, cum certum sit, sangvinem ipsum diversimodè modificare respirationem, ut in subsequentiis patebit.

II. Obstru-



II. Obstructio viarum, ut in asthma communi, bronchiis à pituitâ viscidâ, pure, materia tophacea alióve impedimento obstructis omnem facit paginam; Ita in dyspnœâ vel asthma hypochondriaco-scorbutico rariùs, contra plerumque *expansio pulmonum impedita*, vel quocunque modò *vitiata*, videtur accusanda, quam proin pro *causâ immediatâ lesionum respirationis hypochondriaco-scorbuticarum* venditare non dubitamus, cui usum quoque auctum, quantum fieri poterit, accommodabimus.

III. Impeditur verò vel vitiatur tam necessaria, pro aëris continuâ reciprocatione & recentatione, pulmonum expansio nunc intra pectoris cavitatem, nunc extra eandem.


IV. Intra thoracis cavitatem læditur tum sanguinis (quò nomine universam massam sanguineam, ex dextro cordis ventriculo per pulmones successive in sinistrum, indeque in universum corpus distribuendam, ex sanguine & lymphâ refluâ, chyloque, per ductum thoracicum advecto constantem, complectimur) per pulmones trajiciendi, tum pulmonum culpâ.

V. *Sanguinis culpâ* pulmonum vitiatur expansio modò ob *rarefactionem atque ebullitionem* nimiam, modò ob *stagnationem & grumescentiam* aliqualem sanguinis. *Prius fit*, quando sanguis hypochondriaco-scorbuticus adustus, biliosus, potissimum verò serum acre, lixivum & fluxile nimis, in corde p. n. ebulliens, indeque per arteriam pulmonalem cum impetu in pulmones irruens, bronchia & vesiculas pulmonales comprimit, vasa sanguiflua distendit, ut pulmones relaxari debite, ac pro aëris recentatione rursus expandi sufficienter nequeant. Istam verò ebullitionem & turgescentiam sero inducere varia possunt, v. g. motus corporis animique vehementiores, assumpta acria, caldiora & halitiosa, vel quodcunque extraneum & non miscibile M. S.<sup>ne</sup> confusum, effluvia cohibita, evacuationes solitæ, hæmorrhoidales, menstruæ, suppressæ. Dyspnœa ejusmodi vel *asthma serosum*, uti extra scorbuticam depravationem non rarò quoque occurrit, observatum à *Balth. Timæo lib. II. cas. med. II. Job. Zecchio Bononiensi in Card. Paleotto consult. XXVIII.* cum stranguriâ alternatim infestans; uberius expositum à *Carolo Pisone de morbis à serosa colluvie*. Ita in hypochondriacis & scorbuticis, quibus sanguis serosior, te-



nuior, acuior, in excandescencias & ebullitiones pronus, quàm maximè observatur.

VI. *Posterius* à sangvine crudo, viscido, acido, austero, seroque & chylo simili contingit, qui in cordis ventriculum dextrum illapsus, ob cruditatem & viscositatem non rarefit illicò, ac per arteriam pulmonalem in pulmones exilit, sed in corde stagnare & residere aptus, ipsius oppressionem intendit: in cuius sublevationem respiratio crebrior instituitur, ut sangvine in pulmones exantlato eidem succurratur; quam rationem egregiè diducit ingeniosissimus *Willisus de Febribus cap. 2. & de scorbut. cap. 3.* Hinc est, quòd tùm hora una vel altera à pastu; tùm à motu corporis, plurimum in hypochondriacis intendatur anhelitus difficultas, quatenus ibi chylus crudior sangvini affunditur; hìc verò motu plus cruoris in ventriculum cordis urgetur, quàm respiratione aut pulsu potest in vasa pneymonica derivari, unde respiratio anhelosa, cum suffocationis nonnunquam metu.

VII. Acor verò peregrinus, vel humor acidus, austerus, ponticus sangvini confusus, eundem circa præcordia & vasa pulmonalia plus minus coagulando, ac circulationem æquabilem, turbando, respirationem non potest non insigniter sufflaminare, in cuius rei fidem experimentum à *D. Fracassato, Anatomie Prof. Pisano* institutum apponere lubet, qui infuso in venam jugularem vivi canis  animal aliquandiu more epilepticorum spumasse, citata respiratione aërem traxisse, in demortuo demum sangvinem fixum & grumosum, invenit, ceu referunt *acta philosoph. Societatis Regiæ Anglic. anno 1667. n. 27.* quod experimentum, non impari successu hisce diebus institutum, genuinam catarrhi suffocativi causam investigaturo non parum lucis scenerari posset, quem à sangvinis per pulmones circuitu præpedito potiùs, quàm catarrhosâ à capite depluente colluvie deducendum suspicamur.

VIII. Porrò *flatus* quoque cum sangvine refluxo cordi & pulmonibus communicari, ibidemque modò circulationem turbando, modò pulmones inflando, variè respirationem incommodare posse, tùm *Cl. Sylvius in prax. med.* asserit, tùm & potissimum *Highmorus de passione hysterica & affectione hypochondriacâ* operosè adstruere conatur, adeò, ut non vereatur suffocationem hysteri-

cam



cam unicè à sangvine flatulento, vel nimis rarefacto, pulmones distendente derivare, notatus ob id à *Willisio de morb. convulsivis*.

IX. *Pulmonum culpâ* in hypochondriaco-scorbutico affectu lædi poterit respiratio, quando juxta *Willisii* hypothesein, vel nervi pneumonici, pulmonum expansioni destinati, ob irritationem spasmodicè contracti, reciprocum pulmonum motum impediunt; aut fibræ nerveæ bronchia amplectentes irritatæ eadem coarctant, ut aërem sufficientem admittere nequeant: Vel iidem, nervi pneumonici in visceribus animalibus transitum, quacunque de causa, denegant; sicuti à nervis istis præscisis motum pulmonum, sublatum vidit *B. Schenkius*. Plura in hanc rem paulò post, ubi de asthmate paralytico & convulsivo.

X. *Extra pectoris cavitatem* pulmonum expansio impeditur tum diaphragmatis, tum musculorum respirationi inservientium vitio, idque triplici potissimum de causâ: Aut enim (I) Diaphragma, ob spatii in abdomine defectum, deorsum satis explicari nequit, quod fit, quando hypochondria, potissimum ventriculus & intestina vel flatibus, aut succis vitiosis turgescunt, distenta, vel spasmodicè contracta, motu peristaltico inverso diaphragma, versus thoracis cavitatem compellunt, sicut videmus in hydrope, graviori, uteriq; gestatione sublimi, ob eundem spatii in abdomine defectum, anhelitus difficultatem urgere. Talismodi anhelitus difficultas, ab inflatis vel turgidis hypochondriis, communiter *asthma præcordiale* vocari consuevit, ac in praxi frequentissimè occurrit, cujus exemplū admodum notabile in *observ. med. Hæchstett. schol. ad cas. 9. dec. IX.* legi poterit.

XI. Atque hunc ferè solum diaphragmatis impeditum motum in angustia pectoris scorbuticâ accusant *Sennertus, Horstius, Salom. Alberti, Evgaleus* alique, isto moti fundamento, quòd scorbutici difficulter respirantes nihil de pectore conquerantur, sed affectum locum, ubi gravamen sentiunt, sub diaphragmate ad ventriculi regionem monstrant. *Verùm*, quod pace tantorum virorum dixerim, cum angustia pectoris & spirandi difficultas iis etiam hypochondriacis non rarò obveniat quibus venter & hypochondria satis mollia, ac infra costas subsidentia, spatium pro diaphragmatis motu satis liberum concedunt, in hypochondriis inflatis vel tumefactis non unicè acquiescendum, sed aliæ quoq; dispncæ  
hypo-



hypochondriaco-scorbuticæ causæ admittendæ, quales ante enumeratæ & deinceps nominandæ.

XII. Contingit enim (II.) diaphragmatis & musculorum, respirationi inservientium motum, pro expansione pulmonum, ac consequenter respiratione, necessarium perverti, quando nervi organis prædictis pnevmaticis inserti, fibræque nerveæ musculorum ab acrimoniâ quacunque irritatæ, spasmodicè contrahuntur: Quò facit experimentum à *Schwammerdamio tract. de respirt. sect. II. cap. 2.* institutum, qui nervis diaphragmatis scalpello irritatis, statim contractionem ejus atque explicationem vitari vidit. Ab istiusmodi nervorum irritatione ortum *asthma* vocatur *convulsivum*, nec prisca ignotum seculis, ceu patet ex *Galeno IV. de loc. affect. cap. 7.* ubi scribit, aliam quoque esse dyspnœæ speciem, quum veluti brevi quiete intercipitur opus thoracis, ob musculorū thoracis convulsionem; à *Willisio* verò præ aliis excultum, ac observationibus egregiis stabilitum, *de morbis convulsivis cap. XII.* & in specie dyspnœæ scorbuticæ accommodatum *de scorbut. cap. 3.*

XIII. Sub finem capitis præcedentis monitum fuit, dyspnœam hypochondriacam aliquando adeo intendi, ut cum suffocationis præsentissimo discrimine, & faucium constrictione, omnem quoque vocem intercipiat, & non raro hystericam suffocationem æmuletur. In tali *suffocatione graviore* nervi plexus ganglioformis, & consequenter muscoli laryngis spasmodicè contrahi videntur, qualem laryngis convulsionem in affectu gravissimo, cum deglutitione læsâ & suffocationis periculo conjuncto, artificiosa conjectura colligit *Solenander sect. II. conf. 24.* In *leviore* vero suffocationis discrimine nervorum pnevmonicorum, & motum diaphragmatis ac thoracis absolventium spasmodica contractio, vel etiam hypochondriorum solùm inflatio, aut pulmonum à sanguine flatulento distensio videtur sufficere posse. *vid. supr. §. 8.*

XIV. Dictum modò, à spasmodicâ diaphragmatis & musculorum respirationi dicatur, contractione variè in hypochondriacis & scorbuticis lædi respiracionem, quod nemini mirum videbitur, qui consideraverit, nullum affectum motuum convulsivorum esse feraciorem, quàm scorbutum, quam in rem inter alios legi meretur *Drawitius vom Schmerzmachenden Schar-*



Scharbock. Restat verò ( III. ) alia causa, ob quam diaphragmatis & musculorum respirationi inservientium motus, pro pulmonum expansione summè necessarius, inhibetur, quando nimirum, sufficienti spirituum animalium influxu destituuntur, quam facultatem læsam veteres dixerunt. Sicut enim in artubus à sangvine scorbutico minus spirituoso paralytes & motus impotentiam, quotidie observamus; ita non improbabile, à spirituum & sangvinis, in musculos respiratorios influentium, indispositione, motum, thoracis non parum sufflaminari, eoque magis, si ob nervorum obstructionem spirituum irradiatio tollatur, unde oritur *asthma*, ad differentiam aliorum, *paralyticum*. Adducta jam egregiè confirmat experimentum *Loweri lib. de motu sanguinis cap. 2. nervis octavi paris in cervice arctè ligatis animalis cor tremulum, pectus verò admodum suspiriosum observantis.*

XV. Ab hujusmodi spirituum in organa pneumonica influxu denegato, incubum s. asthma nocturnum aliquando produci non improbabile videtur, sive serum in substantiam cerebri profundius illapsum, quam ut commodè ac expedite fatis recipi possit, oppressionem pororum cerebri & spirituum intentet, quod *Excellentiss. Dn. D. Wedelio Theorem. Med. p. 70.* placet; sive chylus viscosior & crudior cordi advectus, cum subigi nequeat, circularem sanguinis circa præcordia, & hinc spirituum quoque animalium in cerebro atque appendice nervosâ motum turbet; unde turbulenta insomnia, & ob sufflaminatum spirituum animalium in motus organa influxum variarum functionum læsiones. Sola verò respirationis & vocis interceptio phantasiæ offertur, quia solus thoracis motus in somno summè necessarius est.

XVI. Quò pacto à tumoribus, scabie, arthritide scorbuticâ retropulsâ vel retrogradâ, angustia præcordiorum cum spirandi difficultate excitari possit, ex dictis non difficile erit explanare. Materia enim ista extranea, ex massâ sangvineâ semel segregata atque præcipitata, eidem reaffusa cum heterogenea sit & non miscibilis, non potest nõ sanguinis crasin insigniter pervertere, motumq; & circulationem æquabilem turbare, sicut vino contingere observamus, cum feces prius ad fundum detrusæ, denuò commotæ elevantur, vel si heterogeneum aliquid, uti seyum aut sulphur exoticum dolio injicitur, exinde perturbatio insignis concitatur. Ex ebullitione



verò feri scorbutici & inæquali circuitu sanguinis respirationem variè lædi, ex ante dictis constat. Porrò si materia ista heterogenea in nervis pneumonicis deponatur, non mirum est, si nervi isti vel spasmodicè contracti, vel obstructi aut resoluti, pulmonum diaphragmatis & muscutorum thoracis motum naturalem, & consequenter respirationem variè pervertant; Ut alias rationes brevitatibus studio jam non attingamus.

## CAPUT IV.

### *Diagnosis & Prognosis.*

I. **R**espirationis læsæ diagnosis operosè sectari supervacaneum videri posset, cum & sensibus pateat, & ex patientum querulo anhelitu ac suspiriosâ relatione non difficulter colligatur: *Verùm*, cum non quamcunque respirationis læsionem discutiendam sumserimus, sed ex hypochondriaco-scorbuticâ solùm labe inductam, quæ ipsa varias tum causarum, tum graduum aliarumque circumstantiarum ratione admittit differentias, necessarium erit inquirere, quomodo (1) tum ab *asthmate communi, dispnœâ, aliisque vulgò notis respirationis symptomatibus*; tum (2) *a se invicem dignoscendæ respirationis læsiones hypochondriaco-scorbuticæ*; quibus (3) *causarum succinctam diagnosis* subjungemus.

II. Quoad primùm: *Eugalenus, Horstius, Sennertus* inde discrimen petunt, quòd in respiratione difficili, de quâ hæcenus egimus, nihil eorum percipiatur, quæ ad morbos thoracis aliàs necessariò consequuntur, ut sunt tussis, sibilus, stertor, dolor pungens &c. quodque ægroti parum de pectore, plurimum verò de gravamine sub diaphragmate ad ventriculi regionem conquerantur: Quibus jungendum, quòd respirationis hæc difficultas seu potius angustia non perpetua, nec eadem vehementia semper molestat, sed brevibus intervallis vel cesset, vel remittat, ac postea recurrat vel augeatur, ut habet *Sennertus prax. de scorbut. cap. 4.*

III. *Verùm*, cum nec pathognomonica, nec universalia satis atque fida hæc sint signa, non licebit inde de hypochondriaco-scorbuticâ respirationis læsione certò concludere, nisi alia quoque

*utriusque*



*utriusque affectus symptomata*, modò plura, modò pauciora ad-  
jungantur, quorum potiora sunt inflationes ventriculi & tensiones  
dolorificæ hypochondriorum, rugitus intestinorum, ructus infi-  
pidi, nidorosi, acidi, sputatio frequens, cardialgia, φλόγῳσις post  
pastum, vomitus limpidi, acidi, biliosi, nigricantes, alvus modò  
obstinatè contumax, modò in dejectiones profusa, palpitatio cor-  
dis, vertigo, tinnitus aurium, scotomia, pavores & sudores noctur-  
ni, lassitudo totius, δυσᾶρῆσις, mœror insolitus, facies modò palli-  
da, lurida, modò inflata, sicuti universum quoque corpus modò  
aridum atque exsuccum, modò inflatum, obœsitationem mentiens.  
Quibus in *scorbutico corruptionis gradu* jungentur dolores varii  
& inexplicabiles dorso, abdominis, capitis, artuum, modò fixi, mo-  
dò vagi, gingivarum putrilago & cruentatio, crurum modò debi-  
litas, modò tumores, ulcera, erysipelata, maculæ lividæ, purpureæ,  
subindè sparsim in toto corpore, potissimùm hypochondriis ap-  
parentes, hæmorrhagiæ insolitæ, paralyces, apoplexiæ, epilepsiæ,  
motus convulsivi &c. *Urina* modò flammea, saturatè tinctoria, mo-  
dò cruda, pallida, aquosa, plerumque arenulis rubicundis, matu-  
lam incrustantibus, conspicua. Quodsi verò præter dicta, vulga-  
ria pectoralia, incidentia & antiasthmatica nihil juverint, dyspnœ-  
am non essentialem, sed symptomaticam esse, & ex hypochondriis  
foveri, non inanis erit suspicio.

IV. Quoad *secundum*, dictum superiùs, nos quamcunque,  
ex hypochondriacâ ac scorbuticâ labe inductam respirationis dif-  
ficultatem, si levior, *dyspnœa*, si gravior, suspiriosa & anhelosa, *asth-  
matis*; si gravissima cum strangulatione, vel certè suffocatoriâ  
anxietate graviore conjuncta, *suffocationis hypochondriacæ* vel  
*scorbuticæ* nomine complecti, subinde tamen, ubi certum quen-  
dam gradum exprimere non licet, *dyspnœa*, tanquàm generalio-  
ri, nomine utentes. Qui quidem gradus uti methodum medendi  
non multum variant, ita dignosci ab invicem non difficulter  
queunt.

V. Quoad *tertium*, causarum nimirùm dignotionem, eam,  
cum majoris in methodo medendi sit momenti, paulò uberius per-  
sequemur. Itaque ab ebullitione seri scorbutici ortum *asthma* vel  
*dyspnœam* comitabitur ut plurimum φλόγῳσις atque æstuatio tum  
totius, tum potissimùm præcordiorum, ac repletionis in pectore  
C 2 sensus,



sensus, pulsus non minus, ac anhelitus concitatus: ☐ a saturate tincta, flammea, si non in paroxysmo, saltim extra eundem. Anhelitus molestia non continua erit, sed vel periodica, noctu potissimum ingravescens, quatenus tum lecti calore, tum ob solis recessum & Lunæ, humorum dominæ, accessum expanduntur magis atque turgent humores serosi: Vel inordinatis vicibus invadens, modò absque causâ manifestâ, modò à causis superius recensitis. Aderunt simul alia scorbuti calidi, seu bilis adustæ vel  $\Theta$ ium lixivorum sero incoctorum signa, e.g. æstuatio corporis frequens, hæmorrhagiæ aliæque excretiones insolitæ, sudores copiosi, dolores & lancinationes vagæ variis in corporis partibus.

VI. *Contrarium in dyspnœa à chylo viscosiori, sanguineq; simili, vel ob prædominans acidum ad stagnationem & congrumationem prono* observabitur; Pulsus modò debilis, rarus, & ob interruptum sanguinis circuitum inæqualis aut intermittens; modò celer & vehemens, corde pro noxii amolitione fortius insurgente. ☐ a cruda, turbida, pallida. Dyspnœa à sanguine depauperato atque viscido continuò aliquo modo, magis tamen post pastum & motum corporis affligit. Si sanguinis grumescencia intendatur, ac in ipsum cor grumi deponantur, palpitatio cordis & fyncope præ foribus. Aderunt simul alia scorbuti frigidi, seu sanguinis crudi, depauperati, sale acetoso abundantis signa; ut sunt lassitudo & tremor artuum, frigoris sensus, mœstitia, anxietas, dolores fixi magis, tinnitus aurium, visus hebetudo &c.

VI. *Inflationes hypochondriorum, motum diaphragmatis & musculorum pro respiratione necessarium sufflaminantes, suis se* indiciis facile prodent. Ægri de angustia præcordiorum, ac hypochondriorum distensione potissimum conquerentur. Hypochondria repleta, tensa & suspensa erunt, ut ne digitum quidem sub iis recondere liceat. Præcessit flatulentorum usus, vel alia flatuum indicia notabuntur. Sic ex vomitu sub paroxysmi initium, ructuum vehementiâ, copiâ & efflatione, exacerbatione à cibo, aliisque signis asthma flatulentum colligit *Mindererus apud Hæchstett. Schol. ad cas. 9. dec. IX.*

VII. Quanquam & illud probe notandum, sæpè flatus perperam accusari, ubi tensio hypochondriorum & motus inordinatus intestinorum, a mesenterii, intestinorumque, ac potissimum fi  
brarum



brarum nervearum spasmodicâ contractionem dependent, unde semper ad nervosi generis lancinationem, indeque ortam convulsionem alter oculus dirigendus.

**IX.** *Asthma verò convulsivum* ab aliis speciebus dignoscemus, si absint asthmatis serosi, præcordialis, pituitosi signa, thoracis ac hypochondriorum velut constrictio observetur, & alia simul nervosi generis affecti symptomata jungantur: Pulsus ut plurimum satis fortis, ac debito celerior, ac interdum intermittens erit, advertente *Willisio de scorbut. c. 3.*

**IX.** *Asthma paralyticum* uti à sanguine crudiori, depauperato & minus spirituofo superius deduximus, ita ex iisdem ferè, quibus dyspnæa à sanguine crudo inducta, dignoscitur signis, cum quâ non rarò quoque jungitur & coincidit. Erit asthma hoc continuum magis atque contumax, thorax ægrè admodum elevabitur, respiratio rara, laboriosa, pulsus debilis. Ubi obiter notamus, causas in capite præcedente enumeratas rarò solitarias observari, sed frequenter quasdam earum combinari, vel unam alteri succedere, e. g. non rarò asthmatis seroso jungitur vel succedit convulsivum; à chylo sanguineque crudiori inducto, paralyticum: Ut plurimum inflatio hypochondriorum cum fibrarum nervearum convulsione conjuncta, & sic consequenter.

**X.** Quoad *Prognosin*: Læsiones respirationis hypochondriaco-scorbuticæ etsi in se nec lethales, nec incurabiles existant, ob loci affecti tamen nobilitatem, & functionis læsæ dignitatem, periculo non vacant, certè insignem molestiam vitæque tædium, conjunctum semper habent, ob suffocationis mortisque imminētis continuum ferè metum.

**XI.** Ac licet per intervalla plerumque incommodent ægros, & nunc breviores, nunc longiores dent inducias; adhuc remediis convenientibus facilius, quam asthma commune à bronchiorum infarctu ortum, mitigari ac ad tempus benè longum suspendi possint; Cum tamen ab affectu hypochondriaco-scorbutico, ex confessione omnium contumacissimo, foveantur, nec nisi hâc velut radice præcisâ extirpari penitus possint, longis ægritudinibus merito annumerantur, quamvis ob paroxysmorum vehementiam acutis aliquando accenseri queant.

**XII.** Facilius verò curatur asthma serosum, præcordiale &



convulsivum, quàm paralyticum à sanguine depauperato & minus spirituofo inductum, quod ipsum, si virium jungatur exolutio, funestum non rarò sortitur eventum.

XIII. Terminatur spirandi difficultas hypochondriaco-scorbutica ad salutem, causis successivè correctis, aut penitus ac radicitus sublatis; ad mortem subitâ nonnunquam & improvisâ suffocatione, qualem in scorbuticis observarunt *Forestus, Eugalenus aliique plures*; aut in alium morbum, phthisin, cachexiam, hydropem, (potissimum asthma serosum, quod observavit cum aliis *Timæus lib. II. cas. med. II.*) epilepsiam, apoplexiam.

## CAPUT V.

### *Methodus Curatoria.*

I. Cùm læsiones respirationis hæctenus expositæ, non vitio pulmonum essentiali contingant, sed ab hypochondriaco-scorbuticâ depravatione inducantur & foveantur, facilè cuivis patet, eas fundamento subducto spontè corrui turas, nec extirpari penitus posse, nisi radice præcisâ: Unde cura omnis non tam symptomati, quàm morbo, affectui hypochondriaco-scorbutico, obvertenda videri possit.

II. *Verùm*, cùm nec uno icu annosa cadat quercus, nec paucis remediis chronicus ac contumacissimus affectus expugnetur, sed attentam ac continuatam plurium annorum curam deposcat; ad hæc symptoma nostrum ipsò sæpè morbo gravius sui ablationem urgeat, in duabus hisce indicationibus primariis omnis cura studiumque nostrum occupabitur, ut

1. *Urgente paroxysmo anhelitus molestiam auferre vel mitigare, & laborantem à presenti periculo liberare;*
2. *Extra paroxysmum, ne recurrat, depravationem hypochondriaco-scorbuticam successivè eradicare annitamur.*

Prior indicatio *curatoria*, posterior *preservatoria* vocari poterit.

III. *Indicatio curatoria* non tam specificis pectoralibus, incidentibus, expectorantibus, asthmaticis, quàm causæ, pulmonum expansionem impediendi, debitè oppositis, simulque appropriatis



priatis scorbuticis & antihypochondriacis obtinebitur. Cumque causa ista admodum variet, variabunt quoque indicationes & mendendi methodus.

IV. Itaq; *asthma serosum* seu *ab ebullitione feri scorbutici* ortum curabimus 1. *motum ejus inordinatum versus præcordia sistendo.* 2. *colluviem imminuendo.* 3. *acrimoniam, fervorem aliasque qualitates vitiosas corrigendo.* 4. *causas, quantum possibile, amolendo,* quæ quidem ultima indicatio cum scorbuti biliosi curâ coincidit, *cap. VI. §. delineandâ.* Quoad primum & secundum, urgente paroxyfmo, absque morâ *Venæsectio* tum pro revulsione, tum pro evacuatione sanguinis ebullientis, in pede alterutro instituenda, si vires, ætas & aliæ circumstantiæ permittant; Similiter, & *clyster conveniens,* vel *seriducum lenius,* ne humoribus nimium commotis suffocationis periculum intendatur, ex *crem. ♀, jalapp. mechoac.* utrique indicationi egregiè favet, quibus jungenda *diuretica,* serum turgens ad vias urinarias præcipitantia, cum ex observationibus quamplurimis constet, *asthma serosum* superveniente stranguriâ solutum, ac exemplum notatu dignissimum adducat *Johan. Rhodius cent. II. obs. 27.* Pharmacopœi Brixienfis, qui quatuor horis tam graviter spiritum traxit, ut fenestris apertis vix recreari potuerit, intra quatuor verò & viginti horas meliusculè habuit, emissis plus sex & triginta libris urinæ.

V. Eligenda verò diuretica talia, quæ, quod *tertium* erat *indicatum,* feri scorbutici lixivi, biliosi, adusti fervorem, acrimoniam, fluxibilitatem & turgescentiam simul respiciant & corrigant, ut sunt *acidula temperata,* ☉ *li, ☉ is, ☉ li ☉ is, M.S. & aperitiv. Penoti, clyff. ℥ij. corall. præp. lap. ℥. milleped. præp. cum antiscorbuticis temperatioribus* combinata, quibus *diaphoretica* quoque ad feri reliquias per poros cutis eliminandas, & *opiata,* si impetuosior feri ebullientis motus urgeat, sed circumspectè socianda. Formulas ex prædictis concinnare nec instituti, nec temporis ratio permittit; ne tamen omnino recepti moris obliti videamur, sufficiat unam vel alteram adjecisse:

℞. *cremor. ♀ ℥j.*  
*resin. gialap. gr. vj.*  
 ☉ *citr. gtt. ij M.F Pulvis.*  
 S. *Lind=Purgier=Pulverlein.*

Assumi potest in decoct. prunor.  
 aut sero lactis caprill. c. fir. ros.  
 solut. vel vehiculo quodam  
 domestico.



Rz. aq. acetos.  
cichor. ā ʒij.  
succ. citr. ʒj.

℞ Oli ʒ ʒj.  
magist. lap. ʒ. ʒB.  
fir. corall. Querc. ʒj. M. S.

Alterior = Träncklein / wohl umzurütteln / davon zum öffteru  
2. oder 3. Löffel zu nehmen.

Rz. Tinct. rosar. Olat. cum aq. antiscorbut. extract. ʒj. D. S.  
Sonderliche Tinctur 1. 2. oder 3. Löffel in 1. Maasß Bier  
zum ordinär Tränck.

*Acidula*, si contumacior affectus, quatenus tum per alvum,  
tum per □m ac sudorem ferum superfluum expellunt, admo-  
dum commendabiles, viditque ab asthmate seroso acidularum,  
Pyrmontanarum usu, quendam integrè liberatum D. Meibomius,  
*Disp. de resp. diffic.*

VI. *Dispncea à chylo sanguineq; crudiore, viscosiore ac mi-  
nus spirituosio*, quæ dependet, ac constanter hypochondriacos &  
scorbuticos quosdam affligit, non curabitur, nisi jam dicta sangvi-  
nis dyscrasia emendetur. Undè huc accommodanda, quæ *cap. VI.  
§. 7.* habentur. In antecessum tamen moneo, anhelitus difficul-  
tati, si urgeat, præter universalia opponenda esse spirituosia, balsa-  
mica, volatiliora, calidiora, incidentia, acorem corrigentia, fer-  
mentantia, potissimum *ʒlia*, *cap. VI. §. 5.* enumeranda, quæ variis  
indicationibus satisfaciunt, ac in incubo quoq; si quid aliud, egre-  
giè se gerunt. Sic novimus studiosum hypochondriacum, incu-  
bo sæpius afflictum præmissis universalibus, usu *ʒlium* restitutum  
ab *Excell. Dn. Wedelio, Doctore atque Promotore æternum* suspi-  
cindo.

Rz. aq. cinam. spirituos. ʒB.  
asthmat. ʒi.  
esf. helen. ʒj.

℞ \*ci anisat. ʒB.  
fir. antiscorb. Myns ʒj.

M. S. Brusttränckl. ein klein  
Löffel auf 1 mal.

Rz. croc. ʒtis sacchar. ʒj.  
rad. ari præp. ʒB.

spec. aromat. rosat. ʒij.  
flor. ʒris ʒB.

elao sacch. cinam. ʒB. M.  
F. Pulvis, Dos. ʒB.

in vino chalybeato vel alio vehi-  
culo conveniente.

VII. Quod si verò *sanguis circa præcordia* ob grumescenti-  
am aliqualem, coagulationem ab acido factam, vel quacunque aliâ  
de causâ, *stagnans* insignem anhelitus difficultatem cum suffoca-  
toriâ



toriâ anxietate causetur, omni ope allaborandum, ut stagnatio impediatur, & sanguinis circularis motus promoveatur, cui fini consultum absque morâ Venæsectionem instituere, atque diaphoretica volatiliora & resolventia exhibere, v.g. *Tinct. bezoart. mist. simpl. rutheriacal. campb. gum. Hci cum* ⊕, *sperm. cet. lap. S. aq. chærefol. nasturt. vel succus expressus*, qualia in catarrho suffocativo non absque fructu exhiberi posse arbitror.

℞. *lap. S. pp. ʒ℞.*

*sperm. cet. ʒ℞.*

⊖ *vol. succin. gr. vj.*

M. pro 2. dof. in cerevis.

calida.

℞. *succ. bellid.*

*chærefol. express. ā ʒj.*

*lap. S. præp. ʒj.*

*acet. bezoart. ʒ℞.*

*sir. de bysop. ʒj. M.F. Potio pro*

3. dof.

VIII. *A flatibus inductum asthma curabitur* (1.) *flatus discutiendo*, modò per purgantia vel clysterem carminativum, modò per aromatica & carminantia vulgò nota, e.g. *∇ S menth. fœnic. zedoar. vite Matthiol. anticol. Michaël. carminativ. Sylvii.* ⊕, ⊖ *dulc. Efs. carminativ. Exc. D. Wedelii in Opiologia descripta, Mixtur. carminativ. Sylvii*: Quibus nervina & opiata, non inconsultò miscentur, cum plerumque inflationes ventriculi & intestinorum cum spasms fibrarum nervearum sint conjunctæ. (2.) *flatuum causam tùm evacuando, tùm corrigendo*: Evacuant commodissimè VOMITORIA, quibus, ut loquitur *Willisus Pharmac. rat. sect. III. cap. 3.* visciditas pontica, stomachi plicis firmiùs impacta, velut scopis purgatur. Sic inveteratam dyspnœam in sene omnibus frustra tentatis, exhibitâ per vices aquâ benedictâ, & maximâ pituitæ copiâ *ανω νεψ̄ νατω* eductâ sustulit *Balth. Timæus lib. II. ep. 13.* Et in *asthmate præcordiali* nullum præsentius levamen vomitoriis rite adhibitis vidit *Excell. D. Wedelius.* Quâ ratione studiosum asthmaticum, cujus supra *cap. 2.* mentio facta, unico exhibito vomitorio ab *Excellent. Dn. Præside* curatum, vidimus. Si vomitoria locum non habeant, adhibenda *cathartica* ex gummatis potissimum, ut *gum. Hco, sagapen. cum resin. galap. & troch. alband.* *Corrigunt* flatuum causam materialem, si viscidior fuerit, acidula cum aromaticis & specificis combinata; si acrimonia acida conjuncta sit, ⊕ia volatilia aromatica & ♂sa; it. ♀lia, absorbentia & invertentia alcalina; sin biliosa, lixiya acrimonia pituitam in flatus resolvat, eligenda acida cum amaricanti-



bus & aromaticis, quæ ipsa tonum ventriculi simul roborabunt, novumque flatuum proventum præcavebunt. Externè, ut tensio hypochondriorum, quæ sæpissimè convulsiva existit, remittat, applicanda paregorica, nervina & penetrantia, ut *sacculi ex herb. paregor. & carminativ.* parati, in vino decocti, calideque applicati. *Empl. ex ladano Cnton. carminativ. Sylvii: O carminativ. Mynsicht.*

Rx. aq. menth. crisp. ℥℞.

Rx. mistur. simpl. ℥ij.

meliss. herb. fœnic. rec. ℥ij.

spir. cochlear. ℥℞.

ess. croc. or.

extract. zedoar. ℥℞. M.S.

❧ ❧ci ā ℥℞.

Zertheilende Mistur, Dos. ℥℞. in haustu cerevis. bis vel ter de die.

extr. castor. gr. vj.

laud. opiat. gr. iij.

c. sir. cort. aurant. ℥j. F. Mixtura Dos. cochl. j. ij.

IX. *A convulsivâ nervorum, musculorum & membranarum contractione ortum asthma hypochondriaco-scorbuticum curabimus (1.) irritationem nervorum sistendo, quod expedient cephalica & nervina, potissimum castorina, gna & opiata, e.g. cran. hum. succin. corall. ungul. alc. præp. specif. cephal. Michael. ☉ volat. succini, CC. lumbric. ❧ fulig. ❧ci, CC. salv. rosmar. extract. vel essent. castor. croci, quam in asthma scorbuto periodico insigniter commendat D. Kölichen act. med. Hassn. ann. 1671. 72. obs. 82. Ess. anod. Wedelii, magist. anod. Rolfincii. (2.) Acrimoniam quamcunque nervosum genus irritantem corrigendo, quod obtinebimus tum præcipitantibus, invertentibus, absorbentibus, tum evacuantibus sæpius jam nominatis: ubi notandum, vomitoria cum vitium nervis impactum concussione fortiori excutiant, in hoc etiam passu, si alia permittant, magno cum fructu adhiberi. (3.) Nervosum genus roborando, cephalicis & nervinis ex suis fontibus petendis.*

Rx. succin. præp.

Rx. aq. epilept. Langii,

ungul. alc. præp. ā ℥℞.

asthmatic. antiscorb. ā ℥℞.

specif. cephal. Michaël. ℥j.

typhor. CC. ℥℞.

castor. ℥℞.

❧ CC. essentif. ℥℞.

laud. opiat. gr. ij. M.F.

essent. croci, castor. ā ℥ij.

c. sirup. hysop. ℥j. F. l.a.

Pulvis pro 3. dos. in aq. cera-

Potio, S. D.

sor. nigr. vel vehiculo do- Brust- und Stärck Träncklein.

mestico.

Dos. cochl. j. ij. bis vel ter de die.

X. Exte-



X. *Exterius regioni pectoris & diaphragmatis adhibenda nervina & paregorica paulò antè §. 8. adducta, v. g. R̄. ꝑ. chamom. ʒij. castor. ʒj. succin. lavendul. destill. ā ʒʒ. Ungv. dialth. ʒj. M. S. Lindernt Sâlblein. Inungatur calidè locis prædictis. Atq̄ ad hunc modum suffocatio hypochondriaca, à convulsis organis respiratoriis subitò sæpè ingruens, curari poterit, exhibendo protinus nervina, potissimum volatilia, v. g. R̄. Esf. croc. castor. ā ʒʒ. anod. gtt. iij. ❧ ❧ ❧, ʒʒ. M. Detur ad gtt. XX. XXX. in vehiculo spirituofo. Sin ab inflatione hypochondriorum atque tensione graviori ingruat, danda nervina cum carminativis superius §. 8. adductis. Interea nec universalia, clysteres aliaque revellentia, nec externa sæpius adducta, negligenda.*

XI. *Asthmatis paralytici cura ex iis, quæ §. 6. atque 9. habentur, molienda, ac in primis omni studio in id incumbendum, ut (1.) spirituum in musculos respirationi dicatos liber repareretur influxus, quò fine, quæ in paralyfi vulgò à Præcticis laudantur, cephalica & nervina volatilia tum internè, tum externè adhibenda. (2.) Sanguinis vigor dejectus successivè instauretur spirituosus, balsamicis, ❧libus, aliisque appropriatis, de quibus quædam §. 6. hujus capitis, plura cap. VI. §. 7. adducuntur.*

XII. *Ubi à scabie, arthritide &c. retropulsâ cordis anxietas cum spirandi difficultate urget, danda DIAPHORETICA, potissimum volatilia, ut ad corporis peripheriam recrementa heterogenea rursus expellantur. Sin æstus simul observetur, ac ebullitio humorum præsumatur, præferenda diaphoretica fixa & temperatiora, ad vias urinarias simul, quod noxium, præcipitantia, ut mist. simpl. lap. ʒ. ❧ diaph. Vid. supr. §. 4. & 5. Cum quibus universalia quoque & antiscorbutica appropriata semper conjungenda.*

XIII. *Enumeratis hæctenus ex pharmaceutico fonte depromptis remediis, diætæ quoque exactum jungendum regimen, vitando, in seroso quidem asthma, quæcunque sanguinem & serum scorbuticum in orgasmum concitare possunt, in præcordiali flatulenta, in convulsivo, paralytico, ac à chyli sanguinisque viscositate & cruditate inducto ea omnia, quæ vel acrimoniam humoribus conciliare, spiritus consumere vel deprimere, ac cruditatem sanguinis augere possunt, quæ quidem ordine recensere, nec tem-*



pus, nec pagellarum angustia permittit. Ante omnia verò eò al-  
laborandum, ut radix morbosa hypochondriaco-scorbutica erua-  
tur, ne identidem repullulent respirationis læsiones.

## CAPUT VI.

### *Methodus præservatoria.*

I. **D**ICTUM in præcedenti capite, quomodo respirationis læsiones  
hypochondriaco-scorbuticæ in paroxysmò veluti sint cu-  
randæ; restat ut causam quoque morbificam amovere, ac labem  
hypochondriaco-scorbuticam, quantum possibile, eluere anni-  
tamur.

II. Ad duo verò in affectus hypochondriaci & scorbutici  
curatione potissimùm attendendum, I. *Ut materia peccans debite  
ac sufficienter evacuetur, simulque viscerum & vasorum obstructio-  
nes expediantur:* II. *dyscrasia massæ sanguineæ hypochondriaco-  
scorbuticæ emendetur, viscerumque tonus ac fermenta instauren-  
tur.* De singulis, ob pagellarum atque temporis angustiam, bre-  
vissimè, plura desiderantem ad *Excell. Horstium, Sennertum, Wil-  
lisium* aliosque de affectuum horum curâ latius agentes, remis-  
suri.

III. Itaque quoad prius: Minera morbifica vel in primis  
viis hæret, vel in visceribus & massa sanguineâ. Utramque, ma-  
ximè tamen priorem, præmissis, si visum fuerit, digestivis & præ-  
parantibus appropriatis deinceps nominandis, evacuant I. **C**LY-  
**S**TERES pro usus exigentia sæpiùs repetiti, quibus vel solis despe-  
ratos hypochondriacos in integrum restitutos scribit *Herc. Saxo-  
nia lib. I. præx. cap. 16.* 2. **V**OMITORIA, si æger ad vomendum  
dispositus, pituita viscida, vitrea plicis ventriculi inhæreat, mate-  
ria biliosa turgens sursum vergat, nec aliæ circumstantiæ dissuade-  
ant. 3. **P**URGANTIA ( $\alpha$ ) *mitiora*, si humores mobiles, lixivi, bi-  
liosi, adusti peccent, ne exasperentur. ( $\beta$ ) *in formâ liquidâ* potis-  
simùm, vel certè vehiculo sufficiente diluenda, cum hypochon-  
driaci cum quoad totum, tum potissimùm quoad intestina ut plu-  
rimùm sint ficciores. ( $\gamma$ ) *humori peccanti debita.* ( $\delta$ ) *per em-  
pneum* evacuantia; *vinum passulatum laxativum, nodulus ex aperi-  
tivis appropriatis & purgantibus combinatus, pilula* *Ææ Quer-*



cet. *ſiles Excell. Dn. Præſidis, hypochondriaca Exc. D. Mackii*, alternis vel menſibus, vel ſeptimanis, interpoſitis digeſtivis & aperitivis appropriatis aſſumendæ.

IV. Ubi verò maſſæ ſanguineæ firmius inhæret vitium, illud vel per poros cutis eliminare ſtudebimus *diaphoreticis*, pro ſeri ſanguinisque conditione, nunc volatilioribus, nunc fixioribus aut temperatis; vel ad vias urinarias præcipitare *diureticis* paſſim obviis, quorum proin tùm materiam, tùm formulas congerere, brevitatis ſtudio, ſuperſedeo, cùm ex aperitivis & ſpecificis mox ſecuturis non pauca huic intentioni ſimul ſatisfaciant. Hùc *Veneſectio* referri poterit, quatenus non quidem determinatè vitioſum ſolum ſanguinem evacuat, ſed quatenus parte ſuperfluâ detractâ ad vegetiorem fermentationem atque heterogeneorum ſegregationem maſſam ſanguineam diſponit: Quâ ratione *hemorrhoides* quoque ſupervenientes non parum adjumenti præſtant.

V. *Evacuantia prædicta* circumſpectè ad tempus aliquod continuata, ſimul *viſcerum & vaſorum obſtructiones inſigniter expediunt*, maximè ſi vel præmittantur, miſceantur, interponantur, aut ſubjungantur *aperitiva hepatica & ſplenetica* vulgò nota, pro humoris peccantis conditione nunc ACIDA, ☿ *aperitiv. Penot. Tinct. aperitiv. Mæbii*, ☿ ☉ *ſolis*, ☿ ☽ *M. S. arcan.* ☿, ☿ ☉ *glatus, crem. & cryſtall.* ☿: nunc ALCALINA magis, modò fixa, ☿ *lixiva varia, Tinct. ☿, arcan. duplic. Mynſ.* modò volatilia, ☿ & ☿ *volat.* ☿, ☿ *ci*, CC. quò antiſcorbutica volatiliora referenda; nunc polychreſta *amaricantia* ex *cichor. tarax. fumar. cent. min. abſinth. chamædr. &c.* potiſſimum verò *ſilia* indeque producta ☉ *glata varia: crocus ſ aperitivus, ☉ glatus, ſaccharinus, pulv. cachect. Quercet. Excell. Wedelii. Pilule ſiles aperitivæ Excell. Dn. Faſchii, Tinct. ſ abſinthiaca, antiſcorbutica Wedel. cum arcan. ☿ Zwelff. Tinct. ſ ſata correcta Experimentiſ. Dn. Ludovici Tract. de volat. ☿i deſcripta, electuar. chalybeatum Saxoniæ, ſplenetic. Timæi*, & quæ alia ex ſ te præparata proſtant, quæ variis indicationibus ſatisfaciunt, humores acres, acidos ſaturant, abſorbent, invertunt, dulcificant, obſtructiones expediunt, fibras & parietes viſcerum roborant, juxta *Williſium* vegetiorem ſanguini circulationem conciliant, atque adeò in affectu hypochondriaco & ſcorbuto, ſi quid aliud, egregiè ſe gerunt: Omnia prædicta



aperitiva cum aqueis & diluentibus sufficientibus, serolactis, aquis hepaticis, scorbuticis, splenicis modò simplicibus, modò compositis, sub varia forma exhibenda.

VI. Quod alteram indicationem attinet, monitum aliquoties in præcedentibus fuit, duplicem potissimum dyscrasiam sanguinis hypochondriaco-scorbuticam observari; Aut enim sanguis eorum acidus, austerus, fixus, crudus, iners, pituitosus, coctis particulis orbus, vappescens: aut biliosus, adustus, lixivus, acris, præfervidus, sero nunc copiosiore, nunc pauciore dilutus existit, vid. supr. cap. I.

VII. Priorem egregiè corrigunt stomachica calidiora, aromatica, spirituosa, amaricantia, incidentia & antiscorbutica volatilia, e. gr. rad. ari, caryophyllat. pimpinell. helen. raphan. rust. herb. absinth. cent. min. chamaedr. cuscut. cochlear. fumar. piperit. dracunc. escul. nasturt. aquat. sedi min. summit. pini, sem. sinap. cardamom. carv. anis. &c. & varia inde præparata, spiritus, essentia, frupi, succi express. tincturæ, extracta, infusa, decocta, vina, vel cerevisiæ medicatæ &c. quò pertinent omnia  $\Theta$ e volatili, cum primis  $\odot$ oso pollentia. Hinc & acorem absorbentia, invertentia & dulcificantia, terrea,  $\text{F}$ ea, alcalina,  $\Theta$ ia lixiva, potissimum,  $\text{F}$ lia sapius laudata. Ex compositis commendari merentur elix. propriet. antiscorb. Rolf. Elix. antihypochondriacum & scorbut. ejusd. Essentia sudorifera scorbutica Michael.  $\text{F}$  Glata antiscorbut. Wedelii,  $\text{C}$  antiscorbuticus Drawitii, Mynsicht. Electuar. antiscorbut. Mynsicht. Timai, Sennert. splenicum Timai, sirup. chalybeatus Ejusd. antiscorbut. Mynsicht. aliaque  $\text{S}$ . 5. enumerata.

VIII. Posteriolem emendant acidula & antiscorbutica temperatiora, omniaque hepatica vulgò dicta frigida, e. g. herb. acetos. acetosell. beccabung. chelid. min. fumar. bellid. nummular. rad. cichor. tarax. scorzon. gramin. cerasa acida, mala citria, aurantia, ribes, tamarindi, ex quibus itidem infusa, decocta aliæque compositiones variæ parari possunt: Attemperant diluentia, [e. g. serum lactis caprill. acidule, decoct. hordei, aqua antiscorbutica & hepatica temperatiora: Absorbent & præcipitant terrea, testacea, &  $\text{F}$ lia, corall. lap.  $\text{S}$ . concha, ebur, CC. præp.  $\text{F}$  Ale cachect. pulv. absorbens Exc. Wedelii. Figunt, ubi opus fuerit, & ab orgasmo cohibent



cohibent *opiata, austera, papaverina* cum prioribus mista, quorum materia & formulæ passim prostant.

IX. Viscerum tonum, fermenta ac digestionem instaurant, egregiè *Œlia* sæpius laudata, ab *Highmoreo de affect. hyp. cap. 7.* eò potissimum nomine in affectu hypochondriaco commendata, quòd fibras laxatas atque flaccidas stringant. Idem præstant, quanquam non adeò notoriè, amara, juxta laudatum *Highmorum*, quæ proinde cum Martialibus in hepate ac liene roborando primas facilè tenent. Præter dicta ad stomachi digestionem instaurandam egregiè conferent *elix. Oli Myns. stomachicum Rolsinc. nuc moschat. vel zingib. in India conditum.* Plura apud Practicos videri possunt.

X. Nihil verò æquè plerisque intentionibus pro affectu hypochondriaco & scorbutico nondum confirmato eradicando satisfacit, quàm *ACIDULÆ*, consideratè ac cum regimine debito exhibitæ, quæ materiam peccantem per omnia emunctoria corporis evacuant, sanguinis fervorem reprimunt, fibras relaxatas stringunt & roborant, omniaque ea eminenter præstant, quæ de *Martialibus supra §. 5.* adduximus.

XI. In defectu acidularum naturalium, artificiales furrogare conati sunt *Langius, Glauberus aliique*, sed impari plerumque cum successu. Infusiones ex sero lactis caprini, aut vino diluto cum pharmacis congruis paratas, nonnunquam paria cum acidulis in expediendis obstructionibus facere posse asserit *Hoffmannus Disp. de sangv. hypoch. & scorb.* ac testatur experientia, succos ex splenetis & antiscorbuticis recentibus, ut *fumar. cochlear. nasturt. aquat. beccabung. acetosell. absinth. &c.* expressos, vino vel sero caprillo dilutos, ac continuato usu, interpositis evacuantibus debitis, exhibitos, mira quandoque in hypochondriacis ac scorbuticis præstare. Paradigmata talia, apud *Horstium, Sennert. Willis. de scorbut.* extant plura. Ubi sanguis fixior viscosior corrigendus, magnarum virium prædicatur *vinum antiscorbuticum Mynsichti*, quod *R. vini Rhenani ℥iij. succ. cochleariæ, nasturt. aquat. beccabung. acetosæ depurat. an. ℥iij. rad. raphan. sylv. enulæ camp. ireos nost. in orbiculos tenues incis. an. ℥i℥. sem. erucæ contus. ℥j.* Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad usus reserventur, addendo *nuc. mosch. tost. n. ij.* Dos. ab ℥iij. ad ℥iv. mane & vesp. hor. 2. ante cœnam.



cœnam. In dyscrasiâ scorbuticâ biliosa vino substitui poterit, serum lactis caprill. & eâdem vel paulò largiori dosi exhiberi.

XII. Regimen diæteticum ex *Greg. Horstio Tr. de scorbuto & Willisio* hùc accersendum. Tribus solùm verbis moneo, aërem purum eligendum, animum ad lætitiâ componendum, corpus debitè movendum, & vitandam ante omnia medicorum nutriculam intemperantiam.

T A N T U M.

---

**I**Ngenii dotes postquam cognovit Apollo  
tot vicibus sibi conspicuas, seu Vesta pararet  
pharmaca, seu dextrè reseraret viscera ferrum,  
prælia seu nostris junctus perdocta subires,  
atque animum nullo non artis acumine tinctum  
monstrares, satis est, inquit, fac spiritus ore  
imperturbatis tubulis succedat, honores  
inde Tibi venient meriti, Tuque ipse medendo  
succurrens aliis educes nomen ad astra.

*Honoribus meritissimis Cl. Dn. Doctorandi  
ex animo gratulor & successus condi-  
gnos apprecor*

**Georg. Wolffg. Wedelius D.**

---

**O**Ptime CELLARI, Medicinæ nobile Germen,  
rem facis egregiam, dum præmia clara capeffens  
sublimem scandis cathedram. Deus adnue cœptis!  
Quæ non succubuit, quæ non sine laude latebit  
virtus, Cultorem Temet super astra locabit.

*Quibus  
non quidem tuam, Nobilissime Dn. Doctorande, Ami-  
ce conjunctissime, commendo eruditionem, quæ se-  
ipsam expetentibus sufficienter probabit, sed fortu-  
nam, quam dignam judico, quæ ab omnibus bonis  
promoveatur,*

**PRÆSES.**

